

1 Composición

Cada ml de solución inyectable contiene

Dipirona	500mg
Excipientes c.s.p	1ml



2 Indicaciones

En bovinos, caninos, equinos y porcinos como analgésico, antipirético y antiespasmódico

3 Dosis y vía de administración

Bovinos: 25mg de Dipirona/kg de peso vivo. En la práctica 1ml de producto/20kg de peso vivo

Equinos: 12-36 mg de Dipirona/kg de peso vivo, en la práctica 1ml de producto/30kg de peso vivo

Porcinos, Caninos: 25 mg de Dipirona/kg de peso vivo, en la práctica 1ml de producto/20kg de peso vivo.

Se aplica por vía intramuscular o intravenosa lenta cada 8 horas

4. Tiempo de retiro

- La leche producida durante el tratamiento y 2 días después de finalizado el mismo no debe darse para consumo humano.

5. Precauciones generales

- La frecuencia del tratamiento depende del criterio del Médico Veterinario
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario
- Consérvese en sitio fresco, seco y al abrigo de la luz con una temperatura entre 15°C y 30°C

4 Presentación comercial

Frascos por 20, 50 y 100 mL

Colombia Reg. ICA 1062 DB **Venezuela** SASA M.I.10.357. **Ecuador** 8A4-8574 Agrocalidad **Panamá** RF315-04 **Honduras** PF-4783
Guatemala MAGA 01469010,890