



DORAGÁN®

El más efectivo antiparasitario interno y externo
de última generación





Si conoce su campo!



Reg. ICA 6851 MV

DORAGÁN®

Doramectina 1%

Descripción

Solución inyectable - Antiparasitario.

Composición

Doramectina 10,0 mg
Excipientes c.s.p. 1,0 ml

Especies de destino:



Indicaciones

Para el tratamiento y control de parasitosis internas y externas del ganado bovino, ovino-caprino y porcino.

Bovinos:

- Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus placei*, *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Trichostrongylus axei*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus sp.*, *Cooperia oncophora* (incluyendo larvas inhibidas), *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Oseophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Trichuris sp.*, (adultos)
- Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos y cuarto estadio larvario).
- Garrapatas: Ayuda en el control de *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

- Larvas productoras del nuche: *Dermatobia hominis* e *Hypoderma bovis* (estadios parasitarios).
- Ácaros de la sarna: *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei var. bovis* y *Psoroptes communis var. bovis*.
- Piojos: *Linognathus vituli*, *Haemotopinus eurytemus*, *Solenopotes capillatus*.
- Miasis (gusaneras): *Cochliomyia hominivorax* (estadios parasitarios).
- Piojos masticadores: (*Damalinea bovis*) y de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

Ovinos-caprinos:

- Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus contortus* (adultos), *Ostertagia circumcincta* (adultos, L4, incluyendo larvas inhibidas), *Trichostrongylus axei* (adultos L4), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos L4), *Trichostrongylus vitrinus* (adultos L4), *Chabertia sp.*, *Cooperia oncophora* (adultos L4), *Nematodirus sp.*, (adultos L4), *Trichuris sp.*
- Nemátodo pulmonar: *Dictyocaulus filaria*.
- Ácaros: *Psoroptes ovis*.
- Miasis (gusaneras): *Cochliomyia hominivorax*; Gusano de la cabeza: *Oestrus ovis*.

Porcinos:

- Nemátodos gastrointestinales: *Hyostrogylus rubidus* (adultos y cuarto estadio larvario), *Strongyloides ransomi* (adultos), *Ascaris suum*, *Oesophagostomum dentatum*, *Trichuris sp.*
- Nemátodo pulmonar: *Metastrongylus sp.*, (adultos).
- Nemátodo renal: *Stephanurus dentatus* (adultos).
- Ácaro de la sarna: *Sarcoptes scabiei*.

Ventajas

Excelente alternativa frente a la resistencia que han desarrollado parásitos internos y externos a las ivermectinas del mercado.

Dosificación:

- Bovinos, Ovinos-caprinos:**
Aplicar por vía subcutánea exclusivamente 200 µg de Doramectina/kg de peso vivo, en la práctica aplicar 1 ml de DORAGÁN®/50 kg de peso vivo.
- Porcinos:**
Aplicar por vía Intramuscular o subcutánea 300 µg de Doramectina/kg de peso vivo, en la práctica aplicar 1 ml de DORAGÁN®/33 kg de peso vivo.

Vía de administración o aplicación:

- Se aplica por vía intramuscular o subcutánea.

Presentaciones:

- Frascos por 50 y 500 ml.

Tiempo de retiro

- Bovinos y Ovinos-caprinos:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 35 días después de finalizado el tratamiento.
- Porcinos:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.

No administrar a vacas u ovino-caprinos en producción láctea con destino a consumo humano o la industria láctea.

Precauciones

Los envases o cualquier contenido residual del producto deben ser eliminados por incineración.